

# STEIRERSAAT

## Auswahl Pflanzenschutzmittel Mohn Stand Jänner 2017

|   | Mittelbezeichnung               | Gruppe     | Aufwandmenge/ha           | Praxiserfahrungen     |
|---|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Centium CS</a>      | Herbizid   | 0,25 l/ha                 | 0,15 l/ha             |
| Voraufbau bis 3 Tage nach der Saat  |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Boxer</a>           | Herbizid   | 3,5 l/ha                  |                       |
| Voraufbau   |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Callisto</a>        | Herbizid   | 0,8 - 1 l/ha              | 0,6 - 0,8 l/ha        |
| ab Auflaufen der Kultur, im Frühjahr ab 16 (6-Blatt Stadium)  |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Lentagran 45 WP</a> | Herbizid   | 1 kg/ha                   | 2 Anwendungen erlaubt |
| 2 Blattstadium bis Beginn Längenwachstum  |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Fusilade MAX</a>    | Herbizid   | 1 l/ha                    |                       |
| nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2Blatt) bis 21 (Bestockungsbeginn) der Ungr.   |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Fusilade MAX</a>    | Herbizid   | 2 l/ha                    | Quecke                |
| nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke   |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Laudis</a>          | Herbizid   | 2,25 l/ha od. 2x 1,1 l/ha |                       |
| 2,25 l/ha im 4-8 Blattstadium der Kultur oder Splitting (je 1,1 l/ha) im 2-6 bzw. 6-8 Blattstadium der Kultur   Praxistipp: Bei einmaliger Anwendung 1,8 l/ha |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Biscaya</a>         | Insektizid | 0,3 l/ha                  |                       |
| Bei Befall, Stadium 19 (9 oder mehr Blätter entwickelt) bis Stadium 73  |                                 |            |                           |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b>   | <a href="#">Karate Zeon</a>     | Insektizid | 75 ml/ha                  |                       |
| bis knapp vorm Aufblühen der Kultur   |                                 |            |                           |                       |

### Zulassungsnummern der angeführten Pflanzenschutzmittel

| Produkt         | Wirkstoff                     | Registernummer Österreich |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Centium CS      | Clomazone                     | Reg.Nr.: 2733             |
| Boxer           | Prosulfocarb                  | Reg.Nr.: 2525             |
| Callisto        | Mesotrione                    | Reg.Nr.: 2726             |
| Lentagran 45 WP | Pyridate                      | Reg.Nr.: 3462             |
| Fusilade MAX    | Fluazifop-P                   | Reg.Nr.: 2790             |
| Laudis          | Isoxadifen ethyl+Tembothrione | Reg.Nr.: 2912             |
| Biscaya         | Thiclorpid                    | Reg.Nr.: 2995             |
| Karate Zeon     | Lambda-Cyhalothrin            | Reg.Nr.: 3061             |