

# STEIRERSAAT

## Auswahl Pflanzenschutzmittel Kümmel Stand Jänner 2017

|                           | Mittelbezeichnung  | Gruppe     | Aufwandmenge/ha | Praxiserfahrungen     |
|---------------------------|--|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Bandur   | Herbizid   | 3 - 3,5 l/ha    | Bodentyp              |
|                           | Vorauslauf, Nach dem Auflaufen der Kultur, Herbst, ab dem 3. gefiederten Blatt bis Vegetationsende oder Frühjahr, Vegetationsbeginn bis max. Ende des Rosettenstadiums |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Stomp Aqua   | Herbizid   | 3,5 l/ha        |                       |
|                           | Vorauslauf ODER Nachauflauf bis Stadium 12 (2. Laubblatt entfaltet) der Kultur   |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Fusilade MAX   | Herbizid   | 1 l/ha          |                       |
|                           | nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 21 (Bestockungsbeginn) der Ungr.   |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Fusilade MAX   | Herbizid   | 2 l/ha          | Quecke                |
|                           | nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke  |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Boxer  | Herbizid   | 4 l/ha          |                       |
|                           | Nach dem Auflaufen der Kultur; ab dem 2. Standjahr: Frühjahr, nach dem Austrieb  |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Lentagra 45 WP   | Herbizid   | 0,75 kg/ha      | 2 Anwendungen erlaubt |
|                           | 1 Laubblatt bis 4 Laubblatt der Kultur, Ab 2. Standjahr nach Austrieb bis Stadium 14   |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Karate Zeon  | Insektizid | 75 ml/ha        |                       |
|                           | bei Befallsbeginn vor Blüte  |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Pirimor Granulat (T)   | Insektizid | 0,25 kg/ha      |                       |
|                           | Bei Befallsbeginn bis Stadium 49 gegen Blattläuse  |            |                 |                       |
| <b>Anwendungsstadium:</b> | Folicur  | Fungizid   | 1 l/ha          |                       |
|                           | Bei Befallsbeginn, Bis Stadium 61 (Beginn der Blüte); UBAG/HAS:nein  |            |                 |                       |

### Zulassungsnummern der angeführten Pflanzenschutzmittel

| Produkt              | Wirkstoff          | Registernummer Österreich |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Bandur               | Aclonifen          | Reg.Nr.: 2579             |
| Stomp Aqua           | Pendimethalin      | Reg.Nr.: 3107             |
| Fusilade MAX         | Fluazifop-P        | Reg.Nr.: 2790             |
| Boxer                | Prosulfocarb       | Reg.Nr.: 2525             |
| Lentagran 45 WP      | Pyridate           | Reg.Nr.: 3462             |
| Karate Zeon          | Lambda-Cyhalothrin | Reg.Nr.: 3061             |
| Pirimor Granulat (T) | Pirimicarb         | Reg.Nr.: 3238             |
| Folicur              | Tebuconazol        | Reg.Nr.: 2670             |