

STEIRERSAAT

Auswahl Pflanzenschutzmittel Mohn Stand Jänner 2017

	Mittelbezeichnung	Gruppe	Aufwandmenge/ha	Praxiserfahrungen
Anwendungsstadium:	Centium CS	Herbizid	0,25 l/ha	0,15 l/ha
Voraufbau bis 3 Tage nach der Saat				
Anwendungsstadium:	Boxer	Herbizid	3,5 l/ha	
Voraufbau				
Anwendungsstadium:	Callisto	Herbizid	0,8 - 1 l/ha	0,6 - 0,8 l/ha
ab Auflaufen der Kultur, im Frühjahr ab 16 (6-Blatt Stadium)				
Anwendungsstadium:	Lentagran 45 WP	Herbizid	1 kg/ha	2 Anwendungen erlaubt
2 Blattstadium bis Beginn Längenwachstum				
Anwendungsstadium:	Fusilade MAX	Herbizid	1 l/ha	
nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2Blatt) bis 21 (Bestockungsbeginn) der Ungr.				
Anwendungsstadium:	Fusilade MAX	Herbizid	2 l/ha	Quecke
nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke				
Anwendungsstadium:	Laudis	Herbizid	2,25 l/ha od. 2x 1,1 l/ha	
2,25 l/ha im 4-8 Blattstadium der Kultur oder Splitting (je 1,1 l/ha) im 2-6 bzw. 6-8 Blattstadium der Kultur Praxistipp: Bei einmaliger Anwendung 1,8 l/ha				
Anwendungsstadium:	Biscaya	Insektizid	0,3 l/ha	
Bei Befall, Stadium 19 (9 oder mehr Blätter entwickelt) bis Stadium 73				
Anwendungsstadium:	Karate Zeon	Insektizid	75 ml/ha	
bis knapp vorm Aufblühen der Kultur				

Zulassungsnummern der angeführten Pflanzenschutzmittel

Produkt	Wirkstoff	Registernummer Österreich
Centium CS	Clomazone	Reg.Nr.: 2733
Boxer	Prosulfocarb	Reg.Nr.: 2525
Callisto	Mesotrione	Reg.Nr.: 2726
Lentagran 45 WP	Pyridate	Reg.Nr.: 3462
Fusilade MAX	Fluazifop-P	Reg.Nr.: 2790
Laudis	Isoxadifen ethyl+Tembothrione	Reg.Nr.: 2912
Biscaya	Thiclorpid	Reg.Nr.: 2995
Karate Zeon	Lambda-Cyhalothrin	Reg.Nr.: 3061