

STEIRERSAAT

Empfehlung Pflanzenschutzmittel Körnersenf Gelb/Braun Stand März 2018

	Mittelbezeichnung	Gruppe	Aufwandmenge/ha	Praxiserfahrungen
Anwendungsstadium:	Butisan Top	Herbizid	2 l/ha	
	Von Keimblätter voll entfaltet bis 8. Laubblatt entfaltet			
Anwendungsstadium:	Fusilade MAX	Herbizid	1 l/ha	
	Bis Blütenanlagen bzw. -knospen sichtbar; Beginn des Ähren- bzw. Rispschiebens; Von 2. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Seitenspross sichtbar; 1. Bestockungstrieb sichtbar			
Anwendungsstadium:	Fusilade MAX	Herbizid	2 l/ha	Quecke
	Bis Blütenanlagen bzw. -knospen sichtbar; Beginn des Ähren- bzw. Rispschiebens bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke			
Anwendungsstadium:	Effigo	Herbizid	0,35 l/ha	
	Nach dem Auflaufen bis Stadium 50. Nur in Beständen zur Saatgutvermehrung!			
Anwendungsstadium:	Kaiso Sorbie	Insektizid	0,15 kg/ha	
	Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf			
Anwendungsstadium:	Decis Forte	Insektizid	75 ml/ha	
	nach Erreichen von Schwellenwerten; BBCH Stadium 55 - 59			
Anwendungsstadium:	Karate Zeon	Insektizid	75 ml/ha	
	nach Erreichen von Schwellenwerten od Warndienst			
Anwendungsstadium:	Biscaya	Insektizid	300 ml/ha	ausgenommen Erdfloh!
	Bei Befall, Stadium 19 (9 oder mehr Blätter entwickelt) bis Stadium 73 , 2 Anw. Gegen Rapsglanzkäfer			
Anwendungsstadium:	Folicur	Fungizid	1,5 l/ha	max. 2 Anwendungen
	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, Wenn 50 - 60 % der Blüten geöffnet s			

Zulassungsnummern der angeführten Pflanzenschutzmittel

Produkt	Wirkstoff	Registernummer Österreich
Butisan Top	Metazachlor	Reg.Nr.: 3403
Fusilade MAX	Fluazifop-P	Reg.Nr.: 2790
Effigo	Clopyralid	Reg.Nr.: 3332
Kaiso Sorbie	Lambda-Cyhalothrin	Reg.Nr.: 3551
Decis Forte	Deltamethrin	Reg.Nr.: 3554
Karate Zeon	Lambda-Cyhalothrin	Reg.Nr.: 3061
Biscaya	Thiacloprid	Reg.Nr.: 2995
Folicur	Tebuconazol	Reg.Nr.: 2670