

STEIRERSAAT

Empfehlung Pflanzenschutzmittel Mohn Stand März 2018

	Mittelbezeichnung	Gruppe	Aufwandmenge/ha	Praxiserfahrungen
	Centium CS	Herbizid	0,25 l/ha	0,15 l/ha
Anwendungsstadium:	Voraufbau bis 3 Tage nach der Saat			
	Boxer	Herbizid	3,5 l/ha	
Anwendungsstadium:	Voraufbau			
	Callisto	Herbizid	0,8 - 1 l/ha	0,6 - 0,8 l/ha
Anwendungsstadium:	ab Auflaufen der Kultur, im Frühjahr ab 16 (6-Blatt Stadium)			
	Lentagran 45 WP	Herbizid	1 kg/ha	2 Anwendungen erlaubt
Anwendungsstadium:	2 Blattstadium bis Beginn Längenwachstum			
	Fusilade MAX	Herbizid	1 l/ha	
Anwendungsstadium:	nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2Blatt) bis 21 (Bestockungsbeginn) der Ungr.			
	Fusilade MAX	Herbizid	2 l/ha	Quecke
Anwendungsstadium:	nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke			
	Laudis	Herbizid	2,25 l/ha od. 2x 1,1 l/ha	
Anwendungsstadium:	2,25 l/ha im 4-8 Blattstadium der Kultur oder Splitting (je 1,1 l/ha) im 2-6 bzw. 6-8 Blattstadium der Kultur Praxistipp: Bei einmaliger Anwendung 1,8 l/ha			
	Biscaya	Insektizid	0,3 l/ha	
Anwendungsstadium:	Bei Befall, Stadium 19 (9 oder mehr Blätter entwickelt) bis Stadium 73			
	Karate Zeon	Insektizid	75 ml/ha	
Anwendungsstadium:	bis knapp vorm Aufblühen der Kultur			

Zulassungsnummern der angeführten Pflanzenschutzmittel

Produkt	Wirkstoff	Registernummer Österreich
Centium CS	Clomazone	Reg.Nr.: 2733
Boxer	Prosulfocarb	Reg.Nr.: 2525
Callisto	Mesotrione	Reg.Nr.: 2726
Lentagran 45 WP	Pyridate	Reg.Nr.: 3462
Fusilade MAX	Fluazifop-P	Reg.Nr.: 2790
Laudis	Isoxadifen ethyl+Tembothrione	Reg.Nr.: 2912
Biscaya	Thiclorpid	Reg.Nr.: 2995
Karate Zeon	Lambda-Cyhalothrin	Reg.Nr.: 3061