

STEIRERSAAT

Empfehlung Pflanzenschutzmittel Kummel Stand Marz 2018

	Mittelbezeichnung	Gruppe	Aufwandmenge/ha	Praxiserfahrungen
Anwendungsstadium:	Bandur	Herbizid	3 - 3,5 l/ha	Bodentyp
	Vorauslauf, Nach dem Auflaufen der Kultur, Herbst, ab dem 3. gefiederten Blatt bis Vegetationsende oder Fruhjahr, Vegetationsbeginn bis max. Ende des Rosettenstadiums			
Anwendungsstadium:	Stomp Aqua	Herbizid	3,5 l/ha	
	Vorauslauf ODER Nachauflauf bis Stadium 12 (2. Laubblatt entfaltet) der Kultur			
Anwendungsstadium:	Fusilade MAX	Herbizid	1 l/ha	
	nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 21 (Bestockungsbeginn) der Ungr.			
Anwendungsstadium:	Fusilade MAX	Herbizid	2 l/ha	Quecke
	nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke			
Anwendungsstadium:	Boxer	Herbizid	4 l/ha	
	Nach dem Auflaufen der Kultur; ab dem 2. Standjahr: Fruhjahr, nach dem Austrieb			
Anwendungsstadium:	Lentagra 45 WP	Herbizid	0,75 kg/ha	2 Anwendungen erlaubt
	1 Laubblatt bis 4 Laubblatt der Kultur, Ab 2. Standjahr nach Austrieb bis Stadium 14			
Anwendungsstadium:	Karate Zeon	Insektizid	75 ml/ha	
	bei Befallsbeginn vor Blute			
Anwendungsstadium:	Pirimor Granulat (T)	Insektizid	0,25 kg/ha	
	Bei Befallsbeginn bis Stadium 49 gegen Blattlause			
Anwendungsstadium:	Folicur	Fungizid	1 l/ha	
	Bei Befallsbeginn, Bis Stadium 61 (Beginn der Blute); UBAG/HAS:nein			

Zulassungsnummern der angefuhrten Pflanzenschutzmittel

Produkt	Wirkstoff	Registernummer Osterreich
Bandur	Aclonifen	Reg.Nr.: 2579
Stomp Aqua	Pendimethalin	Reg.Nr.: 3107
Fusilade MAX	Fluazifop-P	Reg.Nr.: 2790
Boxer	Prosulfocarb	Reg.Nr.: 2525
Lentagran 45 WP	Pyridate	Reg.Nr.: 3462
Karate Zeon	Lambda-Cyhalothrin	Reg.Nr.: 3061
Pirimor Granulat (T)	Pirimicarb	Reg.Nr.: 3238
Folicur	Tebuconazol	Reg.Nr.: 2670